

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2020/2021

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren									
		6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60	
			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2				
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)																
Tetanus <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>								A1		A2			A <sup>e</sup>	
Diphtherie <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>								A1		A2			A <sup>e</sup>	
Pertussis <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>								A1		A2			A3 <sup>e</sup>	
Hib <sup>b</sup> H. influenzae Typ b		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Poliomyelitis <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>									A1					
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>													S <sup>g</sup>	
Meningokokken C							G1													
Masern							G1				G2							S <sup>f</sup>		
Mumps, Röteln							G1				G2									
Varizellen							G1				G2									
HPV Humane Papillomviren													G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>						
Herpes zoster																			G1 <sup>h</sup>	G2 <sup>h</sup>
Influenza																			S (jährlich)	

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen  
 G Grundimmunisierung  
 (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)  
 A Auffrischimpfung  
 S Standardimpfung

a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen  
 b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen  
 c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate  
 d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich  
 e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung  
 f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit  
 g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff  
 h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten  
 \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden